





























# FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fase	Duración	Cantidad de personas*	Propósito
 <p>Fase 1</p>	 1 mes	 10-20	 ¿Es seguro?  ¿Cómo lo procesa el cuerpo?  ¿Cuáles son los efectos secundarios?
 <p>Fase 2</p>	 3 - 12 meses	 50-75	 ¿Es seguro?  ¿Está funcionando bien?  ¿Cuánto hay que administrar?
 <p>Fase 3</p> <p><i>Si tiene éxito</i></p>	 6 - 12 meses	 100-300	 ¿Es seguro?  ¿Está funcionando bien?  ¿Es mayor el beneficio que el riesgo?
<p><b>Aprobación de la FDA</b></p>  →  →  →  <p>Se presenta la solicitud → Se revisa la solicitud → Se aprueba la solicitud → Disponible para el público</p> <p>(6-12 meses)</p>			
 <p>Fase 4</p>	 3 - 12 meses	 100-300	 ¿Todavía parece ser seguro?  ¿Hay efectos secundarios poco frecuentes?  Costo-eficacia y comparación con otras medicinas similares

 = 15 participantes sanos    
  = 15 participantes con FQ    
  = Cantidad de meses de participación

\*La cantidad de participantes varía según las características del estudio